

## 皮下注射

病者姓名：\_\_\_\_\_

藥物名稱：\_\_\_\_\_ (濃度：\_\_\_\_\_ /ml)

所需的藥物劑量：\_\_\_\_\_



= \_\_\_\_\_ 毫升 cc

請與K8 護士預約時間 - 示範及實習。

實習前 - 應閱讀小冊子，觀察護士技巧。注意要點及安全。

抽藥 → 選擇部位 → 拭酒精 → 待乾 → 藥物注射

部位的選擇



1. 洗手。
2. 核對：病者姓名、藥物名稱、濃度、劑量、有效日期。
3. 用酒精藥棉消毒注射藥瓶的塞子。待乾，約一分鐘。
4. 將針筒的針套拉出。把針咀插入藥瓶的塞子。不可讓針咀接觸其它物品
5. 用針筒將相等於所需的藥物劑量的空氣注入藥瓶中。
6. 抽藥：將藥瓶倒轉過來，抽出需要的劑量，彈走氣泡，才將針頭拔出。
7. 安坐椅邊，放鬆肌肉。(以免注射了的藥物從注射部位回流。)
8. 用酒精紙消毒注射部位的皮膚。方法是從中間向外打轉。待乾，約一分鐘。
9. (呈)起皮膚。用一隻手將針筒垂直插入皮膚中。
10. 將藥物注射入皮下中。
11. 稍等五秒鐘，放開(呈)著皮膚的手，五秒鐘後，才將針嘴輕輕拔出。
12. 若有輕微流血，應用紗布輕抹注射點。
13. 把藥瓶、針筒放於堅固密封的盛器棄置。
14. 洗手。

如遇有任何問題，請致電護士。 K8N: 2255 3445 / K8S: 2255 3450。

選購地點: 病人合作社

| 代號 Code | 名稱 Items                                   | 參考價目 Price reference |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|
| CLE0006 | 火酒紙 Alcohol swab                           | \$ 20/200包           |
| DIA0016 | 胰島素注射針 Terumo insulin 1 ml syringe 100/Box | \$105.0/Box          |
| DRE0010 | +/- 紗布 Non-woven swab sterile, Pack of 10  | \$7.0/Pk             |